

지구과학II 정답

|    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |
|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| 1  | ① | 2  | ⑤ | 3  | ② | 4  | ⑤ | 5  | ④ |
| 6  | ④ | 7  | ① | 8  | ③ | 9  | ④ | 10 | ① |
| 11 | ③ | 12 | ② | 13 | ③ | 14 | ③ | 15 | ② |
| 16 | ⑤ | 17 | ⑤ | 18 | ① | 19 | ⑤ | 20 | ② |

해설

1. [출제의도] 중력 이상을 이해한다.

ㄱ. 위도가 같은 지점에서는 표준 중력이 같다.  
 [오답풀이] ㄴ. A에서 중력 이상은 (-)값을 나타내므로 실측 중력은 표준 중력보다 작다. ㄷ. 밀도가 큰 ㉠이 분포하는 B에서 중력 이상 값이 (+)이다.

2. [출제의도] 지구 자기장을 이해한다.

A를 따라 이동하면 서편각의 절댓값이 작아지므로 자침이 시계 방향으로 회전한다. 전 자기력의 크기는 일정하고 북극은 커지므로 수평 자기력의 크기는 작아진다.

3. [출제의도] 지구의 자원을 이해한다.

ㄴ. 보크사이트는 고령토가 풍화 작용을 받아 생성되므로 퇴적 광상에서 산출된다.  
 [오답풀이] ㄱ, ㄷ. 망가니즈 단괴는 주로 심해저에 분포하는 해양 광물 자원이다.

4. [출제의도] 지층의 주향과 경사를 이해한다.

ㄱ, ㄴ. 주향을 측정할 때는 클리노미터가 수평을 이루도록 해야 하며, 경사를 측정할 때는 클리노미터가 주향선에 수직이 되도록 경사면에 접촉시켜야 한다. ㄷ. 나무판자의 기울기만 변화시키면 주향은 변하지 않는다.

5. [출제의도] 지각 평형을 이해한다.

ㄱ. A의 밀도를  $\rho$ , 중력 가속도를  $g$ 라 할 때  $\rho g 2h = 1gh$ 이므로  $\rho = 0.5 \text{ g/cm}^3$ 이다. ㄷ. C는 B보다 밀도가 작으므로 B에 C를 올려놓았을 때, B의 밑면에서 받는 압력은 A의 밑면에서 받는 압력보다 작다. 따라서 C의 윗면은 A의 윗면보다 높다.  
 [오답풀이] ㄴ. 밀도가 같은 A와 B의 수면 아래 잠긴 깊이가 다른 현상은 에어리설로 설명할 수 있다.

6. [출제의도] 한반도의 지질 분포를 이해한다.

ㄱ. 경상 누층군인 B에서는 혼펠스가 발견된다. ㄴ. 석회암은 조선 누층군인 A에 많이 분포한다.

7. [출제의도] 천해파의 특징을 이해한다.

ㄱ. 천해파가 진행할 때 물 입자는 타원 운동을 한다.  
 [오답풀이] ㄴ, ㄷ. 파장은 A보다 B에서 짧고, 천해파의 속력은  $\sqrt{gh}$  ( $h$ : 수심)이므로  $V_A = \sqrt{2} V_B$ 이다.

8. [출제의도] 에크만 수송을 이해한다.

ㄱ. 에크만 나선이 시계 방향으로 가면서 점점 짧아지므로 북반구이다. ㄴ. 에크만 수송이 연안에서 먼 쪽으로 일어나므로 용승이 나타난다.  
 [오답풀이] ㄷ. ㉠ 방향으로 이동하는 해수가 더 깊은 곳에 위치한다.

9. [출제의도] 행성의 겉보기 운동을 이해한다.

④ 금성은 서방 최대 이각을 지나 외합의 위치로 이동하고 있으므로 금성까지의 거리는 점점 멀어진다.  
 [오답풀이] ① 천왕성은 합과 서구 사이에 위치하므로 순행한다. ② 토성은 서구와 충 사이에 위치한다. ③ 수성은 동점을 지나는 천구의 적도보다 위쪽에 위치하므로 적위가 (+)값을 갖는다. ⑤ 다음 날 금성의 이각은 작아지고 화성의 이각은 커지므로 금성-지구-화성이 이루는 각은 커진다.

10. [출제의도] 규산염 광물을 이해한다.

ㄱ. A는 감람석, B는 흑운모, C는 석영이다.  
 [오답풀이] ㄴ. 흑운모는 유색 광물이다. ㄷ. 감람석과 석영은 깨짐이 나타난다.

11. [출제의도] 기층의 안정도를 이해한다.

ㄱ. 높이 0~0.5 km에서는 위로 올라갈수록 기온이 높아진다. ㄴ. 높이 1~2 km에서는  $T_1$ 일 때가  $T_2$ 일 때보다 기온의 변화가 크다.  
 [오답풀이] ㄷ.  $T_2$ 일 때 기온 감률이 습윤 단열 감률보다 작으므로 기층의 안정도는 절대 안정이다.

12. [출제의도] 경도풍과 지상풍을 이해한다.

ㄴ. 기압 경도력이 전향력보다 크므로 저기압성 경도풍이다.  
 [오답풀이] ㄱ. 지상풍은 등압선을 가로질러 분다. ㄷ. B는 남반구에 위치하므로 동풍이 분다.

13. [출제의도] 케플러 법칙을 이해한다.

ㄱ. (가)의 질량은 (나)의 질량의 0.27배이다. ㄴ. 공전 주기는 B가 C보다 짧으므로 ㉠은 100보다 작다.  
 [오답풀이] ㄷ. B와 C의 회합 주기는 0.75일이다.

14. [출제의도] 천체의 위치와 좌표계를 이해한다.

ㄱ. 태양의 적경은  $12^h$ 이므로  $T_1$ 일 때 태양은 동쪽 지평선 아래에 있다. ㄷ. 남중 고도 =  $90^\circ - \text{위도} + \text{적위}$ 이므로 이 지역의 위도는  $27^\circ N$ 이다.  
 [오답풀이] ㄴ. A의 적위는 (-)값을 가지므로  $T_2$ 일 때 방위각은  $270^\circ$ 보다 작다.

15. [출제의도] 구름의 발생 과정을 이해한다.

ㄴ. 기온이  $30^\circ C$ 인 A의 상승 응결 고도가 1 km이므로 지표에서 이슬점은  $22^\circ C$ 이다.  
 [오답풀이] ㄱ. (가)에서 높이 1~2 km에서의 기온 감률은 습윤 단열 감률보다 작다. ㄷ. 공기 덩어리가 상승하여 만드는 구름의 두께는 A가 1 km이고 B는 1 km보다 두껍다.

16. [출제의도] 은하의 회전 속도 곡선을 이해한다.

ㄴ. 별 A와 B의 회전 속도가 같으므로 회전 주기는 A가 B보다 짧다. ㄷ. B에서 관측하면 A가 멀어지므로 적색 편이가 나타난다.  
 [오답풀이] ㄱ. 은하의 중심에서 멀어져도 회전 속도가 감소하지 않으므로 이 은하의 질량은 은하 중심부에 집중되어 있지 않다.

17. [출제의도] 조석 현상을 이해한다.

ㄴ. 현재 ㉠ 방향에서 만조이므로 A 지점에서 썰물이 나타난다. ㄷ. A는 12시간 후 현재와 반대 방향에 위치하고, 달은 시계 반대 방향으로 약  $6.5^\circ$  이동한다. 이때 만조인 지역과 A 사이의 거리는 현재보다 가까워지므로 해수면 높이는 현재보다 높아진다.  
 [오답풀이] ㄱ. 달과 가장 가까운 지점에서 기조력의 수평 성분은 0이므로 달은 ㉡ 방향에 위치한다.

18. [출제의도] 기압의 연직 분포를 이해한다.

ㄱ. 1000 hPa 등압면이 동쪽에서 서쪽으로 기울었으므로 상공 100 m 지점의 기압은 B보다 A에서 낮다.  
 [오답풀이] ㄴ. 500 hPa 등압면의 고도는 B에서 5350 m이고 D에서 5550 m이다. ㄷ. 수평 기압 경도력은 북서쪽으로 작용한다.

19. [출제의도] 변광성까지의 거리를 구할 수 있다.

ㄴ, ㄷ. 변광 주기는 약 4일, 절대 등급은 약 -2, 평균 겉보기 등급은 8이므로 거리는 약 1000 pc이다.

20. [출제의도] 성간 물질의 종류와 특징을 이해한다.

A는 성간 티끌, B는 헬륨, C는 수소이다. 성간 소광은 성간 티끌에 의해 일어나고, 성운을 구성하는 성간 물질은 대부분 수소이다.